

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	No. TELÉFONO
Centro Nacional de Intoxicaciones	COSTA RICA	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entréguelos al centro de recolección más cercano o deséchelos de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA:

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado, debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidad por posible daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

AGROINNOVA, S.A. 2 KM AL OESTE Y 300 MTS NORTE DE LA CRUZ ROJA DE SANTA ANA COND. OROSOL #22 SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: (506) 4031 6220, FAX: (506) 4035-6905

**FABRICADO Y FORMULADO POR:
LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD,**

27 Hamered St., Tel Aviv 6812509, ISRAEL
Telf: (972) 3-796 4300, Fax: (972) 3-510 0474
email:Main@luxembourg.co.il

PAÍS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	8702345	20-03-2010

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



FENIKS 62,5 SC

FUNGICIDA – FOSFÓNICO, NITROFENILO
FOSFITO DE POTASIO, CLOROTALONIL

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

FENIKS 62,5 SC es un fungicida a base de fosfito de potasio de sistema completa ascendente y descendente, con acción protectora y curativa. Es rápidamente absorbido a través de las hojas pero también a través de raíces, con translocación vía acropétala y basipétala. Actúa inhibiendo la germinación de las esporas o por bloqueo del desarrollo del micelio del hongo. El clorotalonil es un fungicida no sistémico foliar con acción protectante, actúa afectando la germinación de las esporas de los hongos, tiene acción fungicida y fungistática.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Verifique que el equipo de aplicación, bomba de espalda o equipo mecánico terrestre esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Este producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación. Se deben utilizar boquillas de cono hueco.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de mezcla hasta la mitad con agua, agregue la dosis de **FENIKS 62,5 SC**, agite y termine de llenar con agua limpia. Mantenga el equipo de aplicación en agitación constante.



RECOMENDACIONES DE USO: Costa Rica

CULTIVO	CONTROLA	DOSIS L/ha	APLICACIÓN
Melón: (<i>Cucumis melo</i>) Sandía: (<i>Citrullus lannatus</i>) Pepino: (<i>Cucumis sativum</i>)	Mildió velloso (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	3,0-4,0 L/ha en un vol. de 300 L	Aplicación foliar iniciando a los 23 días después de trasplante, seguida de dos aplicaciones con un intervalo de 7 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

3-4 horas, o utilizar equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y recomendaciones dadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos alcalinos como el Caldo Bordelés, sulfuro de lima o cal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y a la luz, no es corrosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar irritación de los ojos, reacciones alérgicas y temblores, espasmos, disnea.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Dé a beber jarabe de Ipecacuana a una dosis de 30 ml para adultos y 15 ml para niños, seguido de dos vasos de agua. En caso de no tener jarabe, de dos vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo u objeto no punzante.

INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.